

*β. densiflora*³⁴), in Hainen und Weidekoppeln an den meisten Stellen reichlich. Blüht nach der Heuernte.

³⁴) *Orchis conopsea β. densiflora*: Ähre verlängert-pyramidalisch mit sehr dicht stehenden Blüten, Blätter lanzettlich.

Ist unter den merkwürdigeren Varietäten und wahrscheinlich ausdauernd. Sie ist bis jetzt nicht gefunden worden in Schweden. Sie wächst zusammen mit *Orchis conopsea*, aber blüht dessen ungeachtet einen Monat später; ist 3 Mal größer mit dickem und stämmigem Stängel; hat 3/2 Zoll breite fast lanzettliche Blätter, die dicht zusammen an der Wurzel sitzen (bei *O. conopsea* sind diese locker); die Achse bildet einen dicken sich verschmälern den Zylinder (bei *O. conopsea* mehr gleichdick), woran die Blüten so dicht sitzen, dass die Rachis völlig unsichtbar ist zwischen ihnen; die Brakteen sind kürzer als der Helm (bei *O. conopsea* reichen sie über diesen hinaus); der Fruchtknoten ist kürzer und geht mehr rechtwinklig vom Stängel ab,

wodurch die Blüten mehr abwärts gerichtet werden; alle Petalen sind abgestumpfter, kürzer und breiter, die seitlichen gehen mehr nach unten, die Lappen der Lippe sind gleich lang und viel stumpfer, der Sporn ist kürzer, dicker und verschmälert.

Är ibland de märkvärdigare varieteterna och sannolikt persistens. Den är ej funnen förr i Sverige. Den växer tillsammans med *Orchis conopsea*, men blommar detta oaktadt en månad senare; är 3 gånger större med tjock och stadig stjelk; har 3/2 tums breda nästan lansettlika blad, som sitta tätt tillsammans vid roten (på *O. conopsea* äro de sparsa (*sparfa?*)); axet utgör en tät afsmalnande cylinder (på *O. conopsea* mera jemntjockt), hvarpå blommorna sitta så tätt, att Rachis alldeles icke synes emellan dem; Bractee äro kortare än Galea (på *Orchis conopsea* räcka de utom densamma); Germen är kortare och går mera vinkelrätt ut från stjelken, hvaraf blommorna bli mera nedåt ställda; alla petala äro trubbigare, kortare och bredare, lateralia vetta mera nedåt, laciniae labii äro lika långa och mycket trubbiga, sporen är kortare, tjockare och afsmalnande.

Orchis odoratissima ³³⁾, på våta skogsängar här och der temmeligen ymnigt, t. ex. $\frac{1}{2}$ mil söderom Halls kyrka, mellan Ruthe kyrka och gården Koparfve; mellan Wike gård i Boge och Gothemsån; i Sundre: FALK; i Gröfvingbo: SWARTZ.

conopsea. Allestädes i myckenhet.

β. densiflora ³⁴⁾, i lunder och beteshagar på de flesta ställen ymnigt. Blommar efter höbårgningen.

Or-

33) *Orchis odoratissima* är ofta alshög med mycket långt ax och smala nästan gråslika blad.

34) *Orchis conopsea β. densiflora*: spica elongato-pyramidali floribus confertissimis, foliis lanceolatis.

Är ibland de märkvärdigare varieteterna och sannolikt persistens. Den är ej funnen förr i Sverige. Den växer tillsammans med *Orchis conopsea*, men blommar detta oaktadt en månad senare; är 3 gånger större med tjock och stadig stjälk; har $\frac{1}{2}$ tums breda nästan lansettlika blad, som sitta tätt tillsammans vid roten (på *O. conopsea* äro de sparsa); axen utgör en tätt afsmalnande cylinder (på *O. conopsea* mera jemntjockt), hvarpå blommorna sitta så tätt, att Rachis alldeles icke synes emellan dem; Brakteen äro kortare än Galea (på *Orchis conopsea* råcka de utom densamma); Germen är kortare och går mera vinkelrätt ut från stjäl-

Orchis maculata. Allestädes ymnigt.

latifolia. Allestädes.

sambucina, på torra ångar mellan Wall och Hogrån, vid Ljugarn i Ardre och vid Klinta.

Ophrys (470) *ovata* ^{*)}, ganska allmän, kallas Ormblommor.

Monorchis. Här och der.

Nidus avis, på skogsängar i Wall och Hogrån, samt vid Hultungs i Bunge ganska sparsamt.

infestifera myodes. Allestädes.

Serapias longifolia, på våta ångar allestädes; blommar litet före Parnasia.

latifolia, på högläntare skuggrika ångar allestädes; blommar då rågen skåres.

Lonchophyllum, i Hablingebo: SWARTZ.

Zosteria marina. Här och der.

E 3

Cha-

ken, hvaraf blommorna bli mera nedåt ställda; alla petala äro trubbigare, kortare och bredare, lateralia vetta mera nedåt, laciniae labii äro lika långa och mycket trubbiga, sporen är kortare, tjockare och afsmalnande.

*) Uti LINNÉ'S *Gottl. Resa*, sid. 233, anföres *Ophrys foliis cordatis*, hvilket sannolikt är tryckfel och bör heta *ovatis*.

Då jag här alltid brukar *Linne's* namn, så vare dertföre icke ogillad den nyare indelningen af Professor Swartz i *Vet. Acad. Handl.*